

SAVOIR-ÊTRE. SAVOIR-FAIRE.

PRÉPARATION COLOSCOPIE VIRTUELLE

CETTE PRÉPARATION S'ÉCHELONNE SUR 3 JOURS AVANT L'EXAMEN

Vous devez vous procurer les produits suivants à la pharmacie : PICO-SALAX (1 BOITE)+BISACODYLE (4 COMPRIMÉS DE 5MG)
Les produits suivants vous seront fournis par la clinique : EZ-CAT 225 ML (PRODUIT DE CONTRASTE SANS IODE) + GASTROGRAFIN 30 ML
(PRODUIT DE CONTRASTE AVEC IODE)

IMPORTANT

Pendant cette période, vous devez boire beaucoup d'eau afin d'éviter la déshydratation.

JOUR 1 + JOUR 2

LIQUIDES CLAIRS

Eau / Gatorade ou équivalent / Jus de fruits sans pulpe (pomme, orange, limonade) / Liqueurs claires (Seven Up ou Sprite)

DIÈTE SANS RÉSIDU

Pain blanc (sans beurre) / Oeufs bouillis ou pochés / Poulet ou dinde sans la peau, cuit sans gras / Poisson cuit sans gras / Pommes de terre bouillies sans la peau / Riz blanc / Pâtes alimentaires blanches / Tofu (non frit) / Tous les aliments de la diète liquide

JOUR 3 (jour précédent l'examen)

>>> Conseil: Pendant cette journée, soyez à proximité d'une salle de bain.

DIÈTE LIQUIDE TOUTE LA JOURNÉE

- Bouillon ou consommé clair
- Substitut de repas (Ensure ou équivalent à la vanille seulement)
- JELL-O clair ou Popsicle clair
- Thé et café sans lait et en quantité limitée (sucre ou miel permis)

DÉJEUNER

- Boire 1 / 4 de bouteille de EZ-CAT
- Boire la première préparation de PICO-SALAX
- Boire de 4 à 5 verres de liquide clair pour la prochaine heure

DÎNER


- Prendre 2 comprimés de Bisacodyl avec un verre d'eau ou un liquide clair
- Boire 1 / 4 de bouteille de EZ-CAT

17 HEURES

- Prendre la deuxième préparation de PICO-SALAX
- Boire un verre d'eau aux dix minutes pendant une heure - Les selles devraient devenir liquides de couleur claire ou jaune pâle, sans solide

SOUPER

- Boire 1 / 2 bouteille de EZ-CAT



SAVOIR-ÊTRE. SAVOIR-FAIRE.

21 HEURES

- Prendre 2 comprimés de Bisacodyl avec un verre d'eau ou un liquide clair
- Boire une bouteille de Gastrofin dans deux verres de jus d'orange

ATTENTION : SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE À L'IODE, NE PAS PRENDRE LE GASTROGRAPHIN.

MINUIT

- **À JEUN** à compter de cette heure

LE MATIN DE L'EXAMEN

>>> Au levé, **NE PAS** boire et **NE PAS** manger.

Prenez vos médicaments habituels avec une petite quantité d'eau.

////

IMPORTANT :

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, au 418 667-6041.

DIABÉTIQUE

Si vous êtes diabétique et prenez de l'insuline, avisez votre médecin ou votre pharmacien avant de débiter la préparation afin qu'il ajuste les doses.

INSUFFISANCE RÉNALE

Si vous souffrez d'insuffisance rénale, ne prendre qu'un (1) sachet de PICO-SALAX